

*FLORAISSONS LES PLUS INTÉRESSANTES
OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM
PENDANT L'ANNÉE 1954.*

Par A. GUILLAUMIN et H. Rose¹.

DICOTYLEDONES.

Acalypha × morfontanensis Chantrier (*Hamiltoniana* × *marginalis*).

Adromischus maculatus Lem.

— *Poellnitzianus* Werd.

— *trigynus* V. Poelln.

Æschynanthus E verrardii Pellegr. Annam : Djiring (C.R.S.T., n° 21, f. 183), 1^{re} introduction. Les feuilles charnues présentent sur les bords des glandes noires régulièrement espacées ; le calice campanulé n'est pas glabre mais couvert de poils glanduleux bruns analogues à ceux de l'extérieur de la corolle. A. G.

— *Hosseusii* Pellg. ? Viet-Nam (C.R.S.T., n° 7-S 4, f. 191, 1953), 1^{re} introduction. La corolle présente des poils à l'extérieur alors que l'Æ. *Hosseusii* Pellg. = Æ. *macrocalyx* Hosseus non C. B. Clarke en serait dépourvu. Les feuilles ne présentent pas de glandes noires sur le bord. A. G.

Aloinopsis Jamesii L. Bolus.

Altamiranoa Incarum Rose.

Andrographis echiooides Nees.

Asteracantha longijolia Nees.

Aylostera pseudodeminuta Backbg.

Begonia crispipila Elmer.

— *dichroa* Sprague.

— × *Credneri* Hort. Haage et Schmidt 1890 = *B. × gigantea* Nonin².

— *isoptera* Dryand.

— *macrophylla* Dryand.

— *martabanica* A.DC. Annam : Dalat : Chutes d'Ankala (C.R.S.T.,

1. Les floraisons ayant figuré sur les listes précédentes ne sont pas répétées, sauf lorsqu'il s'agit de plantes d'importation directe.

2. Pour l'histoire de cette plante voir l'article de J. GÉROME (*Journ. Soc. nat. Hort. France*, 4^e sér., XXV, p. 280, 1924).

- f. 1, 1954). Correspond à la description bien que la tige ne dépasse pas 2 cm. de longueur. Très semblable à l'échantillon de l'Himalaya oriental (*Griffith* 2598) non cité dans la *Flora of British India*, mais non à celui du Siam (*Keer*, 26.811). A. G.
- *Poggei* Warb.
— *Popenoei* Standley.
— *pubescens* Ridley.
Brasilocactus Hasselbergii Backbg. ex Schaff.
Caralluma Buchardtii N. E. Br.
Crassula perfossa Lam. non DC. Afrique du Sud : Port Elisabeth et environs (*Humbert, Mitchell et Long*, f. 327, 1933).
Crossandra undulæfolia Salisb.
Cyanastrum cordifolium Oliver.
Desmodium gyrans DC.
Dischidia bengalensis.
— *Collyris* Wall. ?
— *purpurea* Merrill.
Duvalia polita NE. Br.
Euphorbia horrida Boiss.
— *Leandriana* Boit.
Ficus Cooperi Hort. ex Regel.
Frailea castanea Backbg.
— *cataphracta* Dams.
— *gracillima* Britt. et Rose.
— *Schilinzkyana* Britt. et Rose.
Gymnocalycium Bruckii Backbg.
× *Helioselenius Maynardii* Rowley (*Selenicereus grandiflorus* Britt. et Rose × *Heliocereus speciosus* Britt. et Rose).
Hemigraphis drimophila Diels.
Huernia campanulata R. Br.
— *macrocarpa* Schweinf. et K. Schum.
— *macrocarpa* Berger var. *Penzigii* White et Sloane.
Kalanchoe Figueiredoi Croizat.
— *lateritia* Engl.
— *Manginii* R. Ham. et Perr. de la Bât.
— *prolifera* R. Hamet.
— *pumila* Bak.
— *Quartiniiana* A. Rich.
— *serrata* Mannoni et Boit.
Kleinia repens Haw.
Lepismium radicans Vöchtung.
Lobivia allegraiana Backbg.
— *Binghamiana* Backbg.

Lobivia leucorodon Backbg.

— *Mangei* Backbg.

— *pectiniata* Backbg.

— *pseudocachensis* Backbg.

— *rebutioides* Backbg.

— *Wegheiana* Backbg.

Notocactus Hasselbergeri Berger.

— *tabularis* Berger.

Macropiper excelseum Miq.

Malvaviscus Conzattii Greenman.

Mamillaria Fischeri Pfeiff.

— *haitiensis* Rose.

— *microthele* Muehl.

— *nivea* Wendl.

— *pusilla* Sweet var. *texensis* (Engelm.).

— *Zeilmanniana* Böd.

Notonia abyssinica A. Rich. Kenya : Nairobi (*Guy Babault*, f. 166, 1949).

Opuntia mojavensis Engelm.

Oxalis Ortgiesii Regel.

Passiflora suberosa L.

Pentas lanceolata K. Schum. var. *alba* Hort.

Peperomia hederaefolia Hort.

— *resedaeiflora* Ed. André.

Phyllocactus pumilus Vaupel.

× *Pragochamaecereus Sternii* (*Chamaecereus Silvestrii* Britt. et Rose

× *Pragochamaecereus praguensis* Fric).

Rebutia chrysacantha Backbg.

— *dasyphrysa* Werd.

— *xanthocarpa* Backbg. var. *coerulescens* Backbg.

Rhipsalis anceps Web.

— *elliptica* Lindberg.

— *megalantha* Löfgreen.

Schizacentron elegans Meissn.

Schwabea ciliaris Nees.

Selenicereus Urbanianus Britt. et Rose. Guadeloupe (*Guillaumin*, 1951).

Stomatium alboroseum L. Bolus.

Strombocactus pseudo-macrohele Backbg.

— *pseudo-macrohele* Backbg. var. *setosus* Backbg.

Tubiflora virgata T. Anders.

Xylosma longifolium Clos.

MONOCOTYLÉDONES.

- Eechmea dichlamydea* Bak.
Aerangis citrata Schltr. Madagascar (*Boiteau*, f. 72, 1946), région d'Ambrasita (donné par *Lecoufle*, f. 223, 1953).
Agave falcata Engelm. (= *A. paucifolia* Tod. ¹).
Aerides odorata Loud.
Aloe laetevirens Link.
— *madecassa* Perr. de la Bât. var. *lutea* Guillaum. var. nov. Madagascar (*Perrier de la Bathie*, f. 221, 1928) ².
Ancistrorrhynchus clandestinus Schltr. Guinée f^{se} : Foulaya (I.F.A.C.), n° 26, f. 10, 1950.
Aneilema sinicum Lindl. Tanganya ou South Rhodesia (*Mission de Béarn*, Alger-Le Cap, 1952-1953, n° 24, f. 144, 1953).
Angraecum bilobum Lindl. Guinée f^{se} : Foulaya (I.F.A.C. Merle, 1952 ?) (déjà fleuri en 1953).
— *distichum* Lindl. Le n° 32, par ses petites feuilles (5 mm. × 3 mm.) ressemble tout à fait à *Angraecum emarginatum* Schltr. = *A. imbricatum* Lindl. = *Limodorum imbricatum* Sw. mais les fleurs sont isolées.
Le n° 31 a des feuilles plus grandes (15 mm. × 8 mm.) mais d'autres échantillons vivants provenant du Sénégal (Schnell, f. 183, 1954) ont des feuilles intermédiaires (10 mm. × 5 mm.).
Il semble qu'il y ait eu confusion entre *A. distichum* et *A. emarginatum*, puisque Rolfe (*Fl. trop. Afr.*, VII, p. 175) identifie *Limodorum imbricatum* à *Mystacidium distichum* Benth. = *Angraecum distichum* Lindl. A. G.
— *Magdalenae* Schltr. et Perr. de la Bât.
Anoetochilus sikkimensis King et Pantl.
Anthurium fastuosum Hort. ex Gentil.
— *gracile* Engl.
— *Hoffmannii* Schott.
— *pentaphyllum* G. Don.
— *radicans* C. Koch et Haage.
Arachnanthe Cathartii Benth.
Arenga Engleri Becc.
× *Biltanthus Beucherii* Hort. Rochrs (*Bilbergia nutans* H. Wendl. × *Cryptanthus Beuckeri* E. Morr.).
Brassia Lawrenciana Lindl. var. *longissima* Reichb. f. (donné par *Lecoufle*, f. 174, 1952, n° E).
Bulbophyllum tenuicaule Lindl. Guinée f^{se} : Ziama (*Adam*, 1 E).

1. Signalé sous ce nom en 1938.

2. *aculeis roseis, bracteis vix coloratis, pedicellis 2 cm longis, alabastris basi aurantiacis apice viridibus, florum perianthio citrino nervis viridibus.* A. G.

Bulbophyllum tortisepalum Guillaum. sp. nov.¹. Annam : Dalat (C.R.S.T., n° 10/S M, f. 156, 1953).

Burmannia disticha L. Annam : Dalat (C.R.S.T., n° 159/Sig., f. 158, 1954).

Cattleya Forbesii Lindl. Brésil : Saõ Paulo (Benard, f. 163, 1951) ?

Les descriptions et les figures indiquent les sépales et les pétales comme vert jaunâtre ou jaune verdâtre ; ici ils sont franchement jaunes comme la tache de la partie antérieure du labelle.

— *Schilleriana* Lindl. et Reichb. f.

Cirrhopetalum longiflorum Schltr. Madagascar (Pr. Millot, n° 12, f. 183, 1949).

Cleisostoma dichroantha Gagnep. Annam : Hauts-plateaux (C.R.S.T., n° 16/S M., f. 156, 1953) ; Dalat : Arbre broyé (C.R.S.T., n° 9, Lambert, leg., f. 183, 1952). 1^{re} introduction.

Coelogyne corymbosa Lindl.

— *Eberhardtii* Gagnep. Annam : Dalat : arbre broyé (C.R.S.T., n° 19, f. 183, 1952, de Sigaldi et Len leg.). 1^{re} introduction.

Crinum distichum Herb. Guinée f^{se} : Conakry (I.F.A.C. ; f. 170, 1949, Chapeau).

— *podophyllum* Bak. Tanganyka en South Rhodesia (*Mission de Béarn*), Alger-Le Cap, 1952-1953, f. 157, 1953, n° 25). Suivant Baker (*Fl. trop. Afr.*, VII), *C. podophyllum* Bak. aurait les spathes de l'inflorescence lancéolées tandis que le *C. giganteum* Andr. les aurait ovales, mais il rapporte à cette dernière la planche 617 de l'*Illustration horticole* (sub. *C. vanilliodorum* Weler) qui montre des spathes nettement lancéolées.

Culcasia scandens Beauv.

Cymbidium lancifolium Hook.

Cypripedium × Aglaon Sanders (*Hitchinsiae × Earl of Tankerville*).

Cyrtorchis Chailluana Schltr. Cameroun : Nyrombé (Merle, f. 179, 1953).

Dendrobium amoenum Wall.

— *anceps* Sw. Annam : Dalat (C.R.S.T., Dendrobium n° 1, f. 158, 1954).

— *bellatulum* Rolfe. Annam : Dalat : arbre broyé (C.R.S.T., n° 13, f. 183, 1952).

— *Cathcartii* Hook f. Indochine : Route de Saïgon à Dalat, entre les km. 140 et 141 (C.R.S.T., n° 96/T.S., f. 138, 1953, Dau leg.).

— *chrysotoxum* Lindl. var. *Delacouri* Gagnep. Annam : Dalat (C.R.S.T., n° 132/Sig., f. 108, 1954).

— *Coelogyné* Reichb. f.

— *crassinode* Bens. et Reichb. f.

1. Voir *Bull. Mus.*, 2^e sér., XXVI, p. 537, 1954.

Dendrobium Devonianum Paxt. Cette espèce qui existe au Tonkin (cfr. *Fl. Indochine*, VI, p. 221) et aussi au Siam suivant Veitch (*Man. Orch. Pl., Dendrob.*, p. 39) a les sépales blancs un peu rosés ainsi que les pétales, ceux-ci étant violettes à l'extrémité avec le labelle présentant sur le disque 2 larges taches orangées à la base, une ligne violette longitudinale et, de chaque côté, de courtes lignes transversales violettes et au sommet une plage violette.

— *Draconis* Reichb. f. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 291/Lên, f. 210, 1953).

— *Gibsonii* Paxt.

— *lituiflorum* Reichb.f.

— *Nathalienis* Reichb. f. var.

Annam : Fimnon (*C.R.S.T.*, n° 278/Lên, f. 199, 1953, Mme de Sigaldi leg.)¹. Sud Viet-Nam : station expérimentale de Trang-bam près de Bien-Hoa (*C.R.S.T.*, n° 8/ST., f. 58, 1954)².

— *Pierardii* Roxb. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° Lên 279, Mme de Sigaldi et Lefèvre leg., f. 199, 1953). Fleurs blanches à labelle jaune primevère marginé de blanc.

— *revolutum* Lindl. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 315/Lên, f. 108, 1954).

— *ricens* Reichb. f., n° 441/Bot. 136, 1954.

— *tetraedre* Lindl. Annam : Dalat : Kréau (*C.R.S.T.*, n° 25, f. 183, 1952).

— *Cobbianum* Reichb. f.

Epidendrum vitellinum Lindl.

Eria confusa Hook f. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 286/Lên, f. 210, 1953).

— *Eberhardtii* Gagnep. Annam : Dalat : Arbre broyé (*C.R.S.T.*, n° 8, f. 183, 1952, Lambert leg.). 1^{re} introduction.

— *langbianensis* Gagnep. var. *major*, Guillaum. var. nov.³. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 3, leg. de Sigaldi et Len., f. 183, 1952).

— *muscicola* Lindl. Annam : Dalat : forêt de Klang yang (*C.R.S.T.*, n° 119/T.S., f. 182, 1953).

— *pulverulenta* Guillaum. sp. nov.⁴. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 30, f. 183, 1952).

— *tomentosa* Hook. f. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 23/S.M., f. 1954).

Haworthia attenuata Haw. var. *deltoidea* Farden.

— — Haw. var. *O'Danoghuena* Fard.

— *bilineata* Bak.

— *Blackbeardiana* V. Poelln.

1. Cfr. *l. c.*, p. 132.

2. Cfr. *l. c.*, p. 540.

3. Cfr. *l. c.*, p. 538.

4. Voir *l. c.*, p. 691.

Haworthia Greenii Bak.

— *integra* V. Poelln.

— *linifolia* Marloth.

— *Revendettii* Uitew.

— *setata* Haw.

Hymenocallis littoralis Salisb.

× *Laeliocattleya Priam* Holford (*Cattelya Harrisoniana* × *Laelio-Cattleya callistoglossa*).

• *Luisia teretifolia* Gaud. (*C.R.S.T.*, n° 285/Lên, f. 210, 1953).

Microstylis commelynnaefolia Zoll.

Nerine flexuosa Herb.

Oberonia dalatensis Gagnep. Annam : Dalat : Arbre broyé (*C.R.S.T.*, n° 10, f. 183, 1952, LAMBERT leg.). 1^{re} introduction.

— *integerima* Guillaum. sp. nov.¹. Annam : Dalat (*C.R.S.T.* n° 159/Sig., f. 158, 1954).

Oncidium ascendens Lindl. Costa-Rica (donné par M. Lecoufle).

Palisota Schweinfurthii C. B. Clarke.

Philodendron elegans Krause.

— *longilaminatum* Schott.

Pholidota imbricata Lindl. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 169/Sig., f. 180, 1954).

Phymatidium tillandsioides Rodrig.

Pitcairnia saxicola L. B. Smith².

Pleione praecox D. Don.

Pleurothallis vittata Lindl.

Podochilus microphyllus Lindl. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 2/Atha, f. 45, 1954).

Polystachya cultiformis Lindl. Madagascar : probablement région d'Ambrosita (donné par Lecoufle sans indication de fiche mais, en réalité, f. 223, 1953).

— *tessellata* Lindl. Cameroun : Nyrombé (*Mercier*, n° 3, f. 179, 1953). Sépales brunâtre, pétales et labelle légèrement rosés, sauf la verrue farineuse du labelle.

Raphidorynchus Moloneyi Finet. Guinée fse : Foulaya (*I.F.A.C.*, f. 180, 1949).

Saccobodium calceolare Lindl. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 1/S.M., f. 156, 1953).

— *Eberhardtii* Finet. Annam : Dalat (*C.R.S.T.*, n° 287/Lên, f. 210, 1953). 1^{re} introduction.

— *pallens* Cathcart = *D. trichomum* Reichb.f.

Sansevieria arborescens Cornu.

1. Cfr. *l. c.*, p. 692.

2. Avait déjà fleuri en 1952.

Sarcopodium annamense Guillaum. Sp. nov.¹. Annam : Dalat (C.R.S.T., n° 12, f. 183, 1952, LÊN. leg.).

Setcrasea striata Hort.

Telipogon andicola Reichb. f. Pérou : vallée de Quincemil, 2.800 m. (RAUH, 103).

Tridactyle tridentata Schltr. Guinée fse : Foulaya (I.F.A.C., n° 3, f. 109, 1952).

Uncifera Maxilla-Leonis Guillaum. Annam : Dalat (C.R.S.T., n° 288/LÊN, f. 210, 1953). 1^{re} introduction.

Vanda Parishii Reichb. f. Annam : Col dc Prenn (C.R.S.T., n° 152/Sig, f. 144, 1954).

— *Parishii* Reichb. f. var. *Marriottiana* Reichb. f. Annam : Dalat (C.R.S.T., n° 1/S.L., f. 108, 1954).

— *Stangeana* Reichb. f.

1. Voir *l. c.*, p. 693.